

Önerilen Laboratuvar İncelemeleri Hakkında Hasta Bilgileri

Kanser Önlemi

Prostat Kanserinin Erken Teşhisi
Rahim Boynu Kanserinin Erken Teşhisi
Bağırsak Kanserinin Erken Teşhisi
İdrar Torbası Kanserinin Erken Teşhisi

Enfeksiyon Önlemi

Cinsel Yollarla Bulaşan Hastalıklar
Chlamydia Enfeksiyonu
HIV-Testi

Hamilelik

Hamilelik Döneminde Enfeksiyonlar
Hamilelik Döneminde Erken Tanı

Yasal sağlık sigortası üyelerinin dikkatine

Arzuladığınız sağlık hizmetlerinin her zaman yasal sağlık sigortası kapsamına girmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Sağlık sigortanız, arzuladığınız tıbbi hizmetlerin ücretinin tamamını veya bir kısmını ödemekle yükümlü değildir. Bu nedenle, laboratuvar analiz ücretlerinin tarafınızdan karşılanması gerekmektedir. Elde edilen laboratuvar neticeleri, tedavi eden hekime ulaştırılacaktır.

Arzuladığınız muayenenin ücreti hakkında doktorunuzdan bilgi alınız!

Kanser Önlemi Prostat – PSA



Prostat Karsinomu

PSA Testi aracılığıyla
Önlem ve Erken Teşhis

Prostat kanseri, Alman erkeklerinde en sık rastlanan kanser kaynaklı ölüm nedenlerinden ikisidir. Prostat karsinomu, yaş ilerledikçe daha sık görülen kanser cinslerinden biridir.

İleri aşamalarda beliren rahatsızlıklar

Bu tümör, çoğu zaman artık çok geç kalındığında ve metastazların oluşumundan veya tümör hücrelerinin çevre dokulara sızmasından sonra rahatsızlık vermeye başlar. En önemli işaretlerden biri su dökerken duyulan rahatsızlıklar olabilir (zayıf idrar akışı, sıklıkla ve özellikle geceleri idrara sıkışma ve idrarın damlayarak akması).

Prostat karsinomu yavaş büyür ve bölgesel olarak çevreye yayılarak metastazlar oluşturabilir. Ancak bu durumdan sonra daha başka rahatsızlıklar meydana gelir (duyusal bozukluklar veya ağrılar). Metastazlar bu aşamada çok küçük boyutlarda olduklarından, yerleri zorlukla tespit edilir. Tümörün idrar borusuna, idrar torbasına veya idrar yoluna sızması durumunda özellikle kasık kemiği ve ağız arası bölgelerinde ağrılara yol açar. Sertleşme sorunu, dölde kan ilavesi ve özellikle kısa süre içerisinde işlevin gerilemesiyle karşılaşan 45 yaş üstü erkeklerin düzenli olarak prostat karsinom muayenesi görmeleri gerekir.

Teşhis ne kadar erken koyulursa, iyileşme olasılığı o kadar artar!

Buna rağmen erkekler, ürologun prostatı yoklayarak ve ek olarak laboratuvar araştırmaları sürdürerek yürüttüğü ön tanı muayenesinden nadiren yararlanıyor.

Kan tahlili erken belirtileri tespit eder

Ön tanı muayenesinde PSA değerinin belirlenmesi büyük önem taşır. PSA kısaltması »prostata özel antijen« anlamına gelir. Bu antijen, prostat hücreleri tarafından üretilen bir protein olup, kan tahliliyle belirlenir. **Muayene sırasında elle yoklamaya kıyasla laboratuvar ortamında gerçekleştirilen nicelikli PSA belirlemesi ile iki kat daha fazla karsinomun tespit edilmesi mümkündür.** PSA değerinin belirlenmesi, prostat kanserinin erken teşhisini sağlar.

Ciddi ölçüde artmış PSA değerleri, prostata karsinomuna işaret edebilir ve bu nedenle ayrıntılı araştırmaların yapılmasına (örneğin doku örneklerinin alınmasına) vesile olur.

Ancak, çoğu yaş ilerlemiş erkeklerde karsinom yerine, idrar dökme bozukluğuna yol açan iyi huylu prostat büyümesine rastlanır. İyi huylu prostat rahatsızlıklarında, prostatın altı kata kadar büyümesi mümkündür. İyi huylu hücrelerin de PSA üretmesi nedeniyle ileri yaştaki hastaların PSA değerleri az miktarda artar. Bu gibi durumlarda, başka proteinlere bağlı olmayan ve iyi huylu hastalıklarda yüksek miktarda üretilen serbest PSA değerlerinin belirlenmesi yardımcı olur.

Serbest PSA miktarının toplam PSA'ya olan oranı hekime, prostat hastalığının "iyi huylu" veya "kötü huylu" özelliğe sahip olup olmadığı hakkında fikir verir.

Prostat karsinomunun erken teşhisi için yılda bir kere PSA miktarını belirleyen kan tahlilinin yaptırılması gerekir. Değerlerin artması durumunda doktorunuz sizi daha ayrıntılı araştırmalar hakkında bilgilendirecektir.

Önerilen Laboratuvar İncelemeleri


Kanser Önlemi

► Prostat (PSA)

Organa özel prostat tümör araması; 50 yaş ve üzeri erkeklerde yıllık bir PSA muayenesi tavsiye edilir; aile öyküsünün pozitif olması durumunda 45 yaşından itibaren.

► Prostat (PSA/fPSA)

Organa özel prostat tümör aramasına ek olarak ayırıştırıcı tanısız belirtilerin aranması; PSA / serbest PSA belirlemesi



Büyüme çoğu zaman iyi huyludur

Öneri: PSA değerini her sene kontrol ettirin