

Önerilen Laboratuvar İncelemeleri Hakkında Hasta Bilgileri

Kanser Önlemi

Prostat Kanserinin Erken Teşhisi
Rahim Boynu Kanserinin Erken Teşhisi
Bağırsak Kanserinin Erken Teşhisi
İdrar Torbası Kanserinin Erken Teşhisi

Enfeksiyon Önlemi

Cinsel Yollarla Bulaşan Hastalıklar
Chlamydia Enfeksiyonu
HIV-Testi

Hamilelik

Hamilelik Döneminde Enfeksiyonlar
Hamilelik Döneminde Erken Tanı

Yasal sağlık sigortası üyelerinin dikkatine

Arzuladığınız sağlık hizmetlerinin her zaman yasal sağlık sigortası kapsamına girmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Sağlık sigortanız, arzuladığınız tıbbi hizmetlerin ücretinin tamamını veya bir kısmını ödemekle yükümlü değildir. Bu nedenle, laboratuvar analiz ücretlerinin tarafınızdan karşılanması gerekmektedir. Elde edilen laboratuvar neticeleri, tedavi eden hekime ulaştırılacaktır.

Arzuladığınız muayenenin ücreti hakkında doktorunuzdan bilgi alınız!

Enfeksiyon Önlemi



HIV-Testi

Enfeksiyon Riski
– ne zaman test ettirmeli?

Bugüne kadar Almanya’da yaklaşık 82.000 kişiye HIV bulaşmış olup, bunlardan yaklaşık 32.500 kişi artık AIDS aşamasına geçmiş, yaklaşık 26.000 kişi ise hayatını kaybetmiştir.

Bağışıklık sistemi çöküyor

HIV enfeksiyonunun en son aşaması olan AIDS, bağışıklık sisteminin bütünüyle çökmesinden dolayı meydana gelir. Enfeksiyonlar ve tümör hastalıkları artık kontrol edilemez hale gelip nihayetinde ölüme yol açar. Her ne kadar tedavilerin etkisi arttırılsa da, henüz sadece hastalığın AIDS aşamasına geçişi ertelenebiliyor. Birkaç yıl boyunca enfeksiyonu yeni kapmış kişi sayısı 2.000 civarında sabitti. 2005 senesinden itibaren ise enfeksiyon sayılarında yeniden tehlikeli bir artış gözlemlendi. 2006 senesinde sayı 2.700 kişiye ulaştı. Korunmadan gerçekleştirilen cinsel birleşmenin barındırdığı bulaşıcı hastalık riskine yönelik gençlerdeki ciddi bilgi eksiklikleri, bu artışın nedeni olarak düşünülmektedir. Ayrıca hastalığın küçümsemesi de riskli davranışlara neden oluyor.

Bulaşma riski

Enfeksiyonu yeni kapmış kişilerin %80’i erkek olup, bunların yaklaşık %70’i eşcinsel birleşimde bulunan erkeklerdir, geriye kalan kişilerin %20’si heteroseksüel ilişkide bulunan,%9’u ise virüsün bulaşmış olduğu uyuşturucu iğneler kullanmış olan kişilerdir. Kan aktarımı sırasında veya anneden bebeğe geçen enfeksiyon oranı ise %1’lerde.

Risk hakkında genel bilgiler

- Heteroseksüel bulaşma riski erkeğe kıyasla kadında daha yüksektir
- Enfeksiyonun vajinal veya oral ilişkiye kıyasla anal ilişkiden bulaşma riski daha yüksektir
- Bazı durumlarda virüs, sağlıklı sümük dokuyu aşmayı başarabiliyor!

HIV arama testi

Enfeksiyon kapmış olabileceğinizi düşündüğünüzde, dilediğiniz bir doktora HIV arama testi yaptırabilirsiniz. Bunun için kan tahlilleriniz alınacaktır.

HIV enfeksiyonunu arama testinde HIV-1 ve HIV-2 virüslerine karşı bağışıklık protein miktarı belirlenir. Enfeksiyon sonrası ilk bağışıklık proteinlerinin üretilmesine kadar geçen zaman süresi insandan insana değişebilir. Bağışıklık protein belirlenmesi ancak 4 ila 12 hafta (ortalama 6 hafta) sonra bir enfeksiyonun olup olmadığını gösterebiliyor. Yeni HIV arama testlerinde, HIV-1 ve HIV-2 virüslerinin yanı sıra ayrıca, HI virüsünün bir bileşeni olan p24-bağışıklık proteini de belirleniyor. Bu sayede, bulaşmanın üzerinden geçen 11. günün sonunda pozitif netice almak mümkünleşiyor.

Negatif bir netice yalnızca testten 3 ay önce herhangi bir bulaşma olasılığının bulunmaması durumunda enfeksiyonu hariç tutabilir.

Pozitif bir netice ise daima ek olarak yapılan bir onaylama testi ile ayrıca teyit edilir.

Test hangi durumlarda önerilir?

- Yabancılarla yada biseksüel veya uyuşturucu bağımlısı gibi risk grubuna dahil kişilerle korunmadan cinsel birleşimde bulunduğunuzda.
- Virüsün anneden çocuğa geçebilmesi nedeniyle hamilelik öncesinde. Gerekirse testin her çift için düşünülmesi gerekir.
- Prezervatif kullanmadan seks yapmayı arzulayan eşler, daha önceden bir enfeksiyonun bulaşıp bulaşmadığını bilmemeleri durumunda kendilerini teste tabi tutmalıdırlar.
- Uzun süren ateş, cilt tümörleri, lenf düğümü şişkinliği veya haftalarca düzelmeyen isaldan kaynaklanan rahatsızlıklar belirlediğinde.

Önerilen Laboratuvar İncelemeleri

Cinsel yollarla bulaşan hastalıklar

- ▶ **STD Esası (HIV/ Veba/ Hepatit B)**
(TPHA, HIV-1/2-Ak, HBc-Ak, HBs-Ag)
- ▶ **STD Tamamlaması**
(Chlamydia trachomatis IgA-Ak ve IgG-Ak, HCV-Ak)
- ▶ **Chlamydia trachomatis**
DNA belirlenmesi
- ▶ **Belso uklu u Mikrobu**
DNA belirlenmesi

Olası enfeksiyondan 11 gün sonra yapılan HIV arama testi